



Полип эндометрия является одним из самых распространенных заболеваний у женщин. Эта болезнь может иметь много осложнений, среди которых:

- Бесплодие.
- Нарушение менструального цикла.
- Повторное вырастание полипов после и переход в полипоз.
- Перерождение в злокачественные образования.
- Снижение количества половых актов из-за болезненных ощущений.
- Возникновение кровотечений и судорог.

Для того, чтобы определить наличие полипов врач проводит несколько диагностических мероприятий:

1. Гинекологический осмотр, но только в том случае, если полип заметен невооруженным взглядом.
2. Взятие мазка Папаниколау.
3. Проведение УЗИ-диагностики.
4. Проведение рентгеновского исследования.
5. Проведение метрографии. Это рентгенография полости матки.
6. Проведение гистероскопии – изучение слизистой матки.

Лечение полипов эндометрия проводится хирургическим путем. Затем врач назначает гормональную терапию. Этот вид полипов может переходить в злокачественный.

Поэтому, его лечение проводят активно и радикально. Женщинам, старше 45 лет, выполняют операцию по удалению матки. Если в семье наблюдается онкологическая предрасположенность, то удаляют матку с придатками.

Полипы эндометрия очень часто наблюдаются во время беременности. Врачи объясняют это гормональной перестройкой организма женщины. Конечно, не стоит планировать беременность при полипе эндометрия, но если уж это произошло, то ничего не поделаешь. Самое главное - это соблюдать рекомендации врача. Что касается мнения врачей по поводу лечения полипов во время беременности, то мнения врачей расходятся. Одни считают, что удалять полипы во время беременности – это не опасная процедура. Другие считают, что лечить полип эндометрия необходимо начинать после родов. Но не стоит забывать о том, что аденоматозные полипы переходят в злокачественные. Поэтому, их нужно удалять независимо от того, планирует женщина беременность или нет.

Для того, чтобы предотвратить возникновение полипов, необходимо соблюдать следующие меры:

1. Регулярно проходить обследование у гинеколога.
2. Проводить гормональную коррекцию при необходимости.
3. Обращаться к врачу при кровотечении из половых органов.
4. Устранять трещины и разрывы во время родов.
5. Пользоваться презервативом при половых контактах с малознакомыми партнерами.
6. Избегать абортов.

Если соблюдать эти меры предосторожности, то болезнь обойдет вас стороной.

Полип эндометрия: лечение и профилактика

Автор: Кукушечка
23.12.2014 02:02
